―――― 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ――――

使用上の注意改訂のお知らせ

2023年1月

非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤
高尿酸血症治療剤
処方箋医薬品[注)]
フェブキソスタット錠

フェブキソスタット錠10mg「杏林」
フェブキソスタット錠20mg「杏林」
フェブキソスタット錠40mg「杏林」
FEBUXOSTAT Tablets

製造販売元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県南砺市井波885番地

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、弊社製造販売の**フェブキソスタット錠10mg「杏林」／フェブキソスタット錠20mg「杏林」／フェブキソスタット錠40mg「杏林」**の「使用上の注意」を一部改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1．改訂内容（下線＿＿＿部：改訂箇所）

<table>
<tr><th>改　訂　後</th><th>改　訂　前</th></tr>
<tr><td>
10.2 併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">―省略―</td></tr>
<tr><td>ロスバスタチン</td><td>ロスバスタチンの血中濃度が上昇する可能性がある。</td><td>本剤がBCRPを阻害することにより、ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、C_{max}が約2.1倍上昇したとの報告がある[2)]。</td></tr>
</table>
</td><td>
10.2 併用注意（併用に注意すること）
<table>
<tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr>
<tr><td colspan="3">―省略―</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

23.主要文献
2) Lehtisalo M, et al.: Clin Transl Sci. 2020; 13(6): 1236-43.

2．改訂理由

相互作用相手薬との整合性を図るため、次のとおり自主改訂いたしました。

・「併用注意」の項に、「ロスバスタチン」に関する注意喚起を追記いたしました。併せて、主要文献を追加いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報」に掲載される予定です。
なお、改訂後の電子添文は弊社ホームページ https://www.med.kyorin-rmd.com/ 及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ https://www.pmda.go.jp/ に掲載されています。併せてご利用ください。
本製品の電子添文はこちらのGS1コードからご覧ください。

フェブキソスタット錠10mg・20mg・40mg「杏林」
(01)14987060310375

医療関係者向けWebサイト
https://www.med.kyorin-rmd.com/
本件に関するお問い合わせ
キョーリン リメディオ株式会社　学術部
TEL 0120-960189　FAX 0120-189099